



Bollettino difesa Nocciolo

n°7 del 19 giugno 2018



CIMICI del NOCCIOLO

Dai conteggi delle catture nelle trappole distribuite sul territorio della provincia di Alessandria, dai risultati degli scuotimenti finora effettuati che evidenziano catture di differenti specie di cimici e da valutazioni riguardanti il comportamento delle popolazioni di questi insetti, si ritiene opportuno effettuare un primo trattamento **sull'intera superficie dei noccioli in produzione** con prodotti insetticidi a base di **LAMBDA-CIALOTRINA** entro la fine di questa settimana.

Non dovranno essere coinvolte le zone perimetrali esterne ai noccioli (boschi, rive spontanee, appezzamenti incolti, etc.) poiché, oltre a non essere consentito, si correrebbe il rischio di danneggiare eventuali popolazioni di insetti utili al controllo naturale delle cimici.

Si raccomanda di rispettare la **dose a ettaro** indicata in etichetta e garantire la miglior copertura possibile.

È fondamentale lo **sfalcio delle fioriture spontanee** sottostanti alle piante per evitare danni agli insetti pronubi.

Rimane attuale il compito di procedere settimanalmente con i "**frappage**": tutto ciò che cadrà dalla pianta sul telo posto sotto ad essa, dovrà essere conservato in un sacchetto di plastica ermetico e consegnato ai tecnici per il controllo (istruzioni complete riportate sul bollettino n°5).